

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області

Західний кукурудзяний жук
(*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)

Станом на 01.01.2018 року загальна площа зараження
західним кукурудзяним жуком становить 6357,26 га.

Шкодочинність

Личинки цього жука живляться корінням кукурудзи, що
призводить до зменшення кореневої маси і ураження
гнилями. Жуки живляться пилком, незрілими зернами та
листям кукурудзи.

Ознаки пошкодження

Рослини пошкоджені личинками жовтіють, відстають у
розвитку, в'януть, а нерідко – гинуть. Пошкоджені дорослі
рослини під час сильних дощів і вітрів легко полягають і
стебло набуває форми «гусячої шиї».



Способи поширення

Розповсюдженн яєць та
личинок цього жука можливе з
транспортом, залишками
грунту на насінні. Перенесенню
жуків на великі відстані сприяє
вітер.

Фітосанітарні заходи

- дотримання сівозміни
(висівати кукурудзу на одному
і тому ж полі можна лише раз
на 3 роки);
- Обробка рослин
пестицидами.



Різні ступені пошкодження коріння (а), вилягання
пошкодженої кукурудзи (б)

У разі підозри щодо виявлення повідомляйте :

Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Підлужжя,

вул. Шевченка, 1

тел/факс.: (0342) 78-76-67

www.zahrost.if@gmail.com